

FMC Latinoamérica S.A.  
Av. Rodrigo de Chávez y Juan  
Tanca Marengo. Ciudad Colon.  
Torre Empresarial 2 - Piso 3.  
Oficina 308  
Guayaquil - Ecuador

Teléfono: (593 04) 3901953



Nombre: **CAYENNE®**

Enero 2021

Página 1 de 2

## FICHA TECNICA **CAYENNE®**

**INSECTICIDA AGRICOLA**  
Concentrado Emulsionable (EC)

**REGISTRO NACIONAL 162 – I 1/NA**  
Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A.

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

#### Composición:

<b>Bifenthrin</b> .....	<b>112.5 g/l.</b>
2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2 dimethylcyclopropane-carboxylate, de formulación a 20 °C	
<b>Zeta-Cypermethrin</b> .....	<b>37.5 g/l.</b>
(S)-alfa-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2 dimethylcyclopropanecarboxylate, de formulación a 20 °C	
<b>Solvent naphta (petroleum)</b> .....	<b>457.46 g/l.</b>
<b>Aditivos:</b> .....	<b>c.s.p. 1 Litro.</b>

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”**

### GENERALIDADES

**CAYENNE®** actúa por contacto o ingestión, los piretroides no son sistémicos y por lo tanto no presenta ningún movimiento en la planta. Actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, afectando las neuronas por interacción e el canal de sodio.

### RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA
<b>Arroz</b> ( <i>Oryza sativa</i> )	<b>Chinche</b> ( <i>Oebalus ornatus</i> )	0,4 L/ha	60 días
<b>Papa</b> ( <i>Solanum tuberosum</i> )	<b>Gusano blanco</b> ( <i>Premnotrypes vorax</i> )	1 L/ha	21 días
<b>Rosa</b> ( <i>rosa sp.</i> )	<b>Trips</b> ( <i>frankiniella occidentalis</i> )	1 ml/l*	No aplica

\*Gasto De Agua= 1000 Litros/Ha

**Periodo de reingreso:** 24 horas, en caso de requerir ingresar al cultivo antes de este periodo, usar equipo de protección personal completo.

### FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

En **papa**, para gusano blanco la aplicación se dirigirá al tercio inferior de la planta realizando 3 aplicaciones/ciclo (deshierbe, aporque y 30 días antes de la cosecha).

En **arroz** se realizará una sola aplicación total a la planta en estado lechoso del grano con un umbral de 4 chinches por m<sup>2</sup>. No libere el agua de la inundación dentro de los 7 días siguientes a la aplicación.

En **rosas**, aplique cuando exista el 10 % de botones infestados. Rotar aplicaciones con otros productos de diferente grupo químico y mecanismo de acción a fin de evitar resistencia.

### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Diluya el producto en agua según la dosis recomendada, con equipos convencionales calibrados y dotados de boquillas en buen estado, con el fin de garantizar un buen cubrimiento y penetración del producto. Para preparar la mezcla de aspersión, agregue agua hasta la mitad del tanque y luego la cantidad recomendada de **CAYENNE®** agitándolo bien. Complete el volumen con agua y continúe agitando hasta que el producto esté bien disuelto, luego proceda a realizar la aplicación.

### FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

**FITOTOXICIDAD:** El producto no es Fitotóxico a la dosis indicada en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** **CAYENNE®**, es compatible con la mayoría de agroquímicos comúnmente usados; sin embargo, se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad a escala antes de la aplicación con productos agroquímicos nuevos en el mercado cuando exista alguna duda por parte del aplicador.

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **OJOS:** lavar con abundante agua fresca durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
- **PIEL:** Retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.
- **INGESTION:** NO INDUZCA EL VÓMITO. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente
- **INHALACION:** Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese que respire sin dificultad.

### GUÍA PARA EL MÉDICO

El producto es nocivo por ingestión. Los síntomas que se presentan son sensación de quemazón, zumbido o entumecimiento en la zona expuesta. Estos efectos son transitorios durando hasta 24 horas. Náuseas, vómitos diarrea. Dosis mayores pueden producir disturbios en el sistema nervioso central (temblores, convulsiones, coma).

Realice tratamiento sintomático. La decisión de inducir al vómito o no debe ser tomada por el médico. Si se lleva a cabo un lavaje, se sugiere efectuar control endotraqueal y/o esofágico. No existe antídoto específico.

**“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta cuando corresponda”**



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:**

**1800 VENENO (836366) Atención 24 horas del día**

**Para mayor información dirigirse a:**

**FMC LATINOAMÉRICA S.A. (593 04) 3901953 / Guayaquil - Ecuador**

**ADVERTENCIA:** “Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturándolo o perforándolo, y devuélvalo al distribuidor para su disposición final”.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II  
MODERADAMENTE PELIGROSO – DAÑINO**