

1. NOMBRE COMERCIAL

LIBAMIN MIX

2. NÚMERO DE REGISTRO

2473-F-AGR

3. COMPOSICIÓN

Aminoácidos libres	4% p/p
Materia orgánica total	30% p/p
Nitrógeno (N) total	3,0% p/p
Nitrógeno (N) orgánico	2,4% p/p
Nitrógeno (N) amoniacal	0,6% p/p
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	3,0% p/p
Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	2,0% p/p
Boro (B) soluble en agua	0,08% p/p
Zinc (Zn) soluble en agua quelado por EDTA	0,04% p/p

4. PROPIEDADES

LIBAMIN MIX, está especialmente indicado para los momentos de enraizamiento del cultivo después de la plantación y en aquellos casos que sea preciso un mayor desarrollo del sistema radicular.

5. MODO DE EMPLEO

En un recipiente con agua agregar la dosis indicada del producto, realizar la mezcla y agregar al tanque conteniendo la cantidad de agua suficiente y volver a agitar. Antes de colocar el producto en la bomba, esta debe estar calibrada para que la aspersión del producto sea eficiente y pueda relucir con su mecanismo de acción; se recomienda aplicar en las horas de menos sol, ya sea en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde. Puede ser aplicado en cultivos de campo abierto, bajo invernadero y a nivel de laboratorio para ensayos experimentales. El producto debe usarse luego de la preparación del agua de aplicación, regulando el pH y dureza de la misma.

6. INCOMPATIBILIDAD

Incompatible con productos extremadamente ácidos y/o alcalinos; se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala.

7. FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si es usado correctamente y de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

8. USOS

CULTIVO	DOSIS	GASTO DE AGUA	ÉPOCA DE APLICACIÓN	VÍA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	2 l/ha	200 l	Etapa vegetativa	Foliar 2 aplicaciones cada 15 días
Melón (<i>Cucumis melo</i>)	2 l/ha	300 l	Etapa vegetativa	Foliar 2 aplicaciones cada 15 días
Maíz (<i>Zea mays</i>)	2 l/ha	300 l	Etapa vegetativa	Foliar 2 aplicaciones cada 15 días
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	2 l/ha	300 l	Etapa vegetativa	Foliar 2 aplicaciones cada 15 días
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	2 l/ha	600 l	Etapa vegetativa	Foliar 2 aplicaciones cada 15 días
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	2 l/ha	400 l	Etapa vegetativa	Foliar 2 aplicaciones cada 15 días

“LA INFORMACIÓN PRESENTADA SIRVE COMO UNA REFERENCIA, LA CUAL PUEDE SER ACOGIDA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES FISIOLÓGICAS DE LA PLANTA, CONDICIONES DE CLIMA Y PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DEL SUELO.”