1. NOMBRE COMERCIAL

LAMBADA

2. NÚMERO DE REGISTRO

Registro Nacional: 133 – F5/NA

3. COMPOSICIÓN

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	TIPO DE FORMULACIÓN
Metalaxyl	150 g/l	Polvo Mojable (WP)
Propamocarb	100 g/l	

4. MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Fungicida sistémico con acción curativa y protectante. Absorbido por las raíces y las hojas transportado de manera acropetal. Inhibe la síntesis de proteínas en el patógeno por interferencia en la síntesis del ARN ribosomal por acción del Metalaxyl; a la vez el Propamocarb reduce el crecimiento del micelio y el desarrollo de esporangios, esporas y zoosporas; afecta la permeabilidad de la membrana de la célula por inhibición de la fosfolípidos y biosíntesis del ácido adiposo.

5. MODO DE EMPLEO

Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y aplicar la dosis recomendada de **LAMBADA**. Agitar constantemente hasta formar una suspensión homogénea, luego verterla en el tanque, completar la cantidad a utilizar. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

6. COMPATIBILIDAD

Incompatible con pesticidas alcalinos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala previa a la aplicación

7. TOXICIDAD

Categoría toxicológica II – MODERADAMENTE PELIGROSO

8. USOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	Período de carencia
Tomate riñón (*Lycopersicon esculentum*)	Lancha tardía (*Phytopthora infestans*)	0,8 kg/ha*	Hasta 10 días antes de la cosecha
Rosas (*Rosa* sp.)	Mildiú velloso (*Peronospora sparsa*)	1,5 Kg/ha*	No aplica

*Tomate riñón: 400 litros de agua/hectárea.
*Rosas: 1200 litros de agua/hectárea.

Volumen de agua: se recomienda calibrar el equipo de aspersión para conocer la cantidad de agua a utilizar para cubrir una hectárea de acuerdo a la fenología del cultivo.

Restricción de uso: Utilizar LAMBADA solo para el control de Lancha tardía (*Phytophthora infestans*) en el cultivo de Tomate riñón (*Lycopersicon esculentum*) bajo invernadero.

9. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar el producto sobre el follaje cubriendo todos los órganos expuestos de la planta. Realizar dos aplicaciones con un intervalo de 15 días.

10. FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos en las dosis recomendadas.