

1. NOMBRE COMERCIAL

FINDER

2. NÚMERO DE REGISTRO

Registro Nacional: 25 – F 12/NA – CL1

3. COMPOSICIÓN

INGREDIENTE ACTIVO

Tridemorph

CONCENTRACIÓN

860 g/l

TIPO DE FORMULACIÓN

Líquido miscible en aceite (OL)

4. MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Fungicida sistémico derivado de la morfolina, con acción protectante, es absorbido por las hojas y las raíces, dándole una cierta acción protectora. Se sabe que ejerce su acción anti-fúngico por medio de la inhibición de la síntesis del ergosterol. Puede también inhibir el crecimiento de los organismos que son incapaces de la biosíntesis del esterol.

5. MODO DE EMPLEO

Aplicar en emulsión de aceite – agua. Realizar la aplicación en forma foliar utilizando una fumigadora de mochila (bomba a motor). Realizar la mezcla del producto FINDER con agua para formar una emulsión, mezclar homogéneamente hasta alcanzar estabilidad. Utilizar un emulsificante adecuado en una proporción del 3% del aceite a utilizar.

6. COMPATIBILIDAD

No compatibles con productos que contengan cobre. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala previa a la aplicación.

7. TOXICIDAD

Categoría toxicológica II – MODERADAMENTE PELIGROSO

8. USOS

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS	Periodo de carencia
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0,75 l/ha	1 día

9. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

La aplicación del producto será dirigida sobre el follaje cubriendo todos los órganos expuestos de la planta. Se recomienda realizar dos aplicaciones con una frecuencia de aplicación de 14 días.

10. FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico al cultivo en la dosis recomendada en la etiqueta.