

## 1. NOMBRE COMERCIAL

HACHERO

## 2. NÚMERO DE REGISTRO

Registro Nacional: 69 – F 12/NA

## 3. COMPOSICIÓN

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	TIPO DE FORMULACIÓN
Sulfato de cobre pentahidratado	247 g/l	Concentrado soluble (SL)

## 4. MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Fungicida foliar de acción preventiva. El ión cobre es absorbido por las esporas durante la germinación y se acumula hasta que alcanza una concentración suficientemente alta para matar la célula de las esporas; la actividad se limita a la prevención de la germinación de esporas. La aplicación debe ser realizada antes que las esporas empiecen a germinar.

## 5. MODO DE EMPLEO

Prepare la mezcla diluyendo la cantidad del producto en un poco de agua y agitar, luego echar al tanque que contiene agua a la mitad y completar el volumen de agua requerida manteniendo la agitación.

## 6. COMPATIBILIDAD

No compatibles con plaguicidas altamente alcalinos.  
Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala previa a la aplicación.

## 7. TOXICIDAD

Categoría Toxicológica III – LIGERAMENTE PELIGROSO

## 8. USOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	Periodo de carencia
Banano ( <i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra ( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> )	0,6 l/ha	1 día
Maíz ( <i>Zea mays</i> )	Mancha de asfalto ( <i>Phyllacora maydis</i> )	0,5 l/ha	0 días
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Añublo de la vaina ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	500 ml/ha	0 días

**Volumen de agua:** Banano: 60 litros por hectárea. Maíz: 200 litros de agua por hectárea.

## 9. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

**Banano:** Aplicar con la presencia de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda dos aplicaciones por ciclo, alternando con productos de diferente modo de acción para evitar formación de resistencia.

**Maíz:** se recomiendan dos aplicaciones para obtener un control de tipo consistente para la plaga.

**Arroz:** realizar la aplicación con la presencia de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda 2 aplicaciones por ciclo de cultivo a intervalo de 7 días.

## 10. FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si es utilizado de acuerdo a las dosis recomendadas.



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: FT.FUN.55  
Actualización: 21-Sep-2020  
Rev. Ant.: 31-Ene-2019  
Versión: 03

**Importadora Industrial Agrícola Del Monte S. A.**  
Km 5,5 Vía Durán-Babahoyo, Guayas - Ecuador  
or  
Tel: 593-43 700260 / e-mail: info@delmonte.com.ec

Página PAGE 1 de  
NUMPAGES 2