

1. NOMBRE COMERCIAL

MENTOR

2. NÚMERO DE REGISTRO

Registro Nacional: 41 - IA 7/NA

3. COMPOSICIÓN

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	TIPO DE FORMULACIÓN
Amitraz	200 g/l	Concentrado Emulsionable (EC)

4. MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Insecticida-Acaricida de contacto e inhalación. Probablemente implica una interacción con los receptores de octopamina en el sistema nervioso de los ácaros, causando un aumento en la actividad nerviosa.

5. MODO DE EMPLEO

Para preparar la mezcla de aspersion, disuelva en un recipiente aparte la dosis recomendada de MENTOR; en el tanque con la mitad de volumen a utilizar, vierta esta mezcla y complete la cantidad de agua requerida; agite bien y constantemente. No guarde la mezcla para el siguiente día, preparar únicamente lo necesario. Aplicar inmediatamente después de la preparación.

El producto se puede aplicar en cultivos a campo abierto.

6. COMPATIBILIDAD

No es compatible con productos fuertemente alcalinos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala previa a la aplicación.

7. TOXICIDAD

Categoría Toxicológica III – LIGERAMENTE PELIGROSO

8. USOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	Periodo de carencia
Rosas (<i>Rosa</i> spp.)	Ácaros (<i>Tetranychus urticae</i>)	2,0 l/ha*	Hasta 15 días antes de la cosecha

*800 litros de agua por hectárea.

Volumen de agua: se recomienda calibrar el equipo de aspersión para conocer la cantidad de agua a utilizar para cubrir una hectárea de cultivo.

9. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar con la presencia de la plaga tomando en cuenta el nivel de daño económico, se puede repetir la aplicación cada 7 días hasta controlar las poblaciones de la plaga. No exceder de 2 - 3 aplicaciones por ciclo de cultivo o cosecha.

10. FITOTOXICIDAD

No causa fitotoxicidad al cultivo en la dosis recomendada.