

1. NOMBRE COMERCIAL

CONDE

2. NÚMERO DE REGISTRO

Registro Nacional: 96 – F4/NA

3. COMPOSICIÓN

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	TIPO DE FORMULACIÓN
Epoxiconazole	75 g/l	Concentrado Emulsionable (EC)

4. MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Fungicida preventivo y curativo. Inhibe la C-14-desmetilasa en la biosíntesis de esteroides. De amplio espectro, controla enfermedades causadas por hongos Basidiomycetes, Ascomycetes y Deuteromycetes.

5. MODO DE EMPLEO

Mezcla con aceite: Colocar la dosis del producto en el tanque y agregar la cantidad requerida de aceite para completar el volumen total. Agitar hasta lograr una mezcla completa.

Mezcla con agua: Llenar el tanque de aplicación con agua hasta la mitad, colocar la cantidad recomendada de producto y agitar. Completar con agua el tanque. Debe ser aplicado con equipos que hayan sido calibrados adecuadamente. No se debe aplicar con viento, humedad excesiva de hojas, riesgo de lluvias o con temperaturas superior a 28°C. Para banano usar volumen de mezcla desde 11 hasta 15 l/ha en emulsión.

6. COMPATIBILIDAD

CONDE es compatible con fungicidas como morfolinas, azoles, estrobilurinas y carboxamidas. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala previa a la aplicación.

7. TOXICIDAD

Categoría Toxicológica III – LIGERAMENTE PELIGROSO

8. USOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	Período de carencia
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	1,25 l/ha	1 día

Volumen de agua: se recomienda calibrar el equipo de atomización/aspersión para conocer la cantidad de agua a utilizar para cubrir una hectárea de cultivo.

9. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

La aplicación del producto será dirigida sobre el follaje cubriendo todos los órganos expuestos de la planta. Se recomienda realizar 2 aplicaciones con una frecuencia de 14 días o dependiendo de las condiciones climáticas favorables para la enfermedad.

10. FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada.